



Opération « Jardin Naturel » Fiche technique n°1 La prairie de fauche



Tout savoir sur la fauche d'une prairie

- Une prairie de fauche ne comporte **ni coquelicot, ni bleuet**. Ces plantes annuelles ne se maintiennent d'une année à l'autre que si le sol est suffisamment dénudé pour permettre la germination de leurs graines...ce qui n'est pas le cas dans une prairie de fauche, mais bien dans un champ cultivé. Coquelicots, bleuets et bien d'autres ne fleuriront que si vous retournez le sol au moins tous les deux ans !
- Le plus souvent, le semis de graines de prairie n'est pas nécessaire : le sol renferme suffisamment de graines en dormance qui se manifesteront dès que les conditions leur deviendront favorables. Si l'apport de quelques graines était nécessaire, assurez-vous que leur provenance est locale.
- Plus le sol est pauvre en éléments nutritifs (surtout azote et phosphore), plus la diversité végétale est grande : les sols « riches » favorisent le développement de quelques plantes envahissantes (l'ortie, par exemple), au détriment d'autres espèces.
- Traditionnellement, la prairie de fauche était **fauchée une fois l'an et le foin était emporté**. Comme aucun engrais n'était apporté par ailleurs, le sol s'appauvissait ainsi lentement et des fleurs diverses abondaient. C'est donc cette pratique qu'il faut reproduire pour obtenir une prairie fleurie.
- Comment faucher ? Surtout ne pas broyer les herbes, afin de permettre le ramassage du foin. La faux est assurément l'instrument le plus agréable, mais, pour les adeptes du moteur, la débroussailleuse à disque ou la moto faucheuse conviennent aussi. Vous pouvez apprendre le maniement de la faux lors de journées d'initiation organisées au « Refuge Naturel RNOB » de la Marache.
- Quand faucher ? Sauf exception, une fauche annuelle, effectuée toujours à la même époque, suffit. Deux époques sont favorables :
 - mi-juillet , pour favoriser plutôt les plantes à floraison printanière (cardamine, marguerite...)
 - mi-septembre, pour favoriser les fleurs d'été.
- Beaucoup d'insectes passent l'hiver en se dissimulant dans les hautes herbes ou en y déposant leurs œufs. Il est donc préférable de ne pas faucher la totalité de la prairie en automne. Le mieux est de laisser chaque année une parcelle non fauchée... différente d'une année à l'autre sinon elle évoluera vers un taillis d'arbustes spontanés !